

スレッドリフト治療同意書

スレッドリフトとは、トゲがついた糸を皮下組織から挿入し、脂肪組織にひっかけて、たるみを持ち上げる施術です。メスを使用したり、皮膚を切り取ることなくたるんだ皮膚を吊り上げ、自然な表情を損ないません。およそ6カ月で溶ける糸を使用します。

- 1) 妊娠中の方、妊娠の可能性のある方はこの治療は受けられません。
- 2) 麻酔クリームの外用および麻酔の注射を行います。
リドカインアレルギーをお持ちの方はこの治療は受けられません。
- 3) 入浴・洗顔・洗髪は当日から、メイクは翌日から可能です。
- 4) マッサージ等は3~4週間ほどお控えください。
- 5) 個人差がありますが、3~10日程度むくみや腫れがでる場合があります。
腫れが強い時は冷やしていただき、腫れが治まればそのまま様子を見てください。
1~2日経過しても強い腫れが治まらない場合は受診をしてください。
- 6) 患部に内出血を生じる場合がございます。内出血が出ている場合は患部を少し温めてください。内出血は1~2週間で消失しますが、数日しても治まらない場合など異常を感じましたら早めに受診して下さい。
- 7) こめかみ部分で固定し引き上げるため、5~7日程度こめかみに痛みが生じます。
- 8)
- 9) トゲのついた糸で皮膚組織を物理的に引き上げますので、初めのうちは糸の刺入部にえくぼのような凹みや影ができたりする場合がありますが、日ごとに消失していきます。
- 10) 術後の糸の追加ならびに処置の必要な際は別途費用がかかります。ご了承ください。
- 11) 効果には個人差があります。患部に異常を感じた際には早めの受診をお願いします。

私は、上記内容及び治療に伴うリスクを含めて理解・確認し、納得した上でスレッドリフトの治療を受けることに同意致します。

令和 年 月 日

自筆サイン

保護者（未成年の場合）自筆サイン